



**FEAD**  
FUNDACIÓN ESPAÑOLA  
DEL APARATO DIGESTIVO



---

## ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON

### DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON

La diverticulosis en ocasiones se diagnostica de forma casual al realizar estudios por otro motivo, como TC de abdomen o colonoscopias.

- **Enema de bario o enema opaco.** Es un estudio radiológico en el que se usa bario, un contraste, en un enema dibujando en las radiografías la línea externa del colon. Este es un test clásico que en ocasiones se ha visto reemplazado por el TC.
- **Sigmoidoscopia.** Es una endoscopia (exploración con un tubo flexible con una cámara en el extremo) en la que se explora desde el recto (primera porción del colon que encontramos cuando atravesamos el ano) hasta el sigma (siguiente porción).
- **Colonoscopia.** Es una endoscopia del colon completo.
- **TC.** El TC se utiliza frecuentemente para el diagnóstico de la diverticulitis y sus complicaciones. Si se sospecha una diverticulitis, está es la única prueba recomendada, estando contraindicadas las 3 anteriores.

*Dra. Susana Jiménez Contreras*

*Especialista de la Fundación Española de Aparato Digestivo*

*Xanit Internacional Hospital (Benalmádena, Málaga)*